



Для выращивания саженцев необходимо получить хороший подвой. Для подвоя сильнорослой

яблони лучше всего иметь сеянцы крупноплодных зимостойких сортов, таких как: анис, Антоновка обыкновенная, сеянцы крупноплодных китайек, Грушовки московской, Ранетки пурпуровой.

На сеянцы лесной и уссурийской груш можно прививать грушу.

Только при правильной заготовке и хранении семян можно получить хороший подвой. Семена надо извлечь из зрелых плодов, которые сняты с периферии кроны здоровых и высокоурожайных деревьев. Семена должны быть плотными и полновесными, и иметь блестящую темную кожицу.

Ни в коем случае не заготавливайте семена из плодов, снятых при температуре выше 35 °С, эта температура отрицательно действует на них, и они быстро гибнут при температуре 60 °С.

Для нормальных всходов семян их необходимо готовить к посеву.

Семена надо стратифицировать.

Эта операция осуществляется путем смешивания части семян с двумя, тремя частями промытого песка с влажностью около 60%.

Для стратификации хорошим субстратом являются древесные опилки.

Стратификация, например семян яблони культурных сортов, должна протекать на протяжении 120-130 дней, или как минимум в течение 90 дней. Семена лесной груши должны стратифицироваться в течение 90 дней, а уссурийской груши – 50-60 дней.

Семена после стратификации лучше прорастут, если их перед посевом, где-то за 3-5

## Как вырастить саженцы - Сорты яблок

Автор: Administrator  
14.10.2012 03:00 -

---

дней, тонким слоем рассыпать в помещении, в котором температура колеблется от 18 до 20 °С. Семена необходимо периодически перемешивать, то есть они должны иметь свободный доступ воздуха. Затем эти семена необходимо увлажнить и обратно засыпать в ящики, где они будут находиться до начала прорастания. В случае, когда проростки семян достигнут размера не более 0,5 см, их нужно высеять, чтобы всходы не были с искривленными корнями. Стратифицированные семена сеют в бороздки рядами, между которыми расстояние 50-60 см. Перед посевом семян необходимо в почву на каждый погонный метр ряда внести 1,5-2 кг перегноя (торфа) и 10-20 г суперфосфата.